2026-10-11 CSCA966513902_De_02_Cau_046

Mã bài CSCA966513902_De_02_Cau_046

Đề 02 · Câu 046 · Ngày 2026-10-11

Chương 20 - Thống kê · Dễ

Kết quả D

Các bước giải

Bước 1 – Phương sai đo mức độ phân tán ( ) của dữ liệu quanh trung bình – D đúng.

→ Lý thuyết: Phương sai $s^2 = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2$ đo mức độ phân tán quanh trung bình; độ lệch chuẩn $s = \sqrt{s^2}$. Cộng cùng một số vào mọi giá trị thì trung bình tăng theo nhưng phương sai không đổi.

Bước 2 – A sai (đó là xu hướng trung tâm); B sai (phương sai càng lớn, dữ liệu càng kém ổn định); C sai (đơn vị là bình phương đơn vị dữ liệu).

→ Lý thuyết: nhắc lại – Phương sai $s^2 = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2$ đo mức độ phân tán quanh trung bình; độ lệch chuẩn $s = \sqrt{s^2}$.

Kết luận: chọn D.

Mở đề bài

Lời giải được biên soạn và đối chiếu với đề gốc; các kết luận về thiếu điều kiện được nêu trực tiếp ở trên.