2026-10-22 CSCA30_De_11_Cau_004

Mã bài CSCA30_De_11_Cau_004
Đề 11 · Câu 004 · Ngày 2026-10-22
Chương 02 - Bất đẳng thức · Dễ

Kết quả / 答案 C

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$x \neq 5$，分子零点 3。
→ 原理：分式有意义的条件是分母不为 0，使分母为 0 的值必须排除。
第2步：符号 $+, -, +$。
→ 原理：数轴标根法：把分子、分母的根按顺序标在数轴上，最右侧区间与最高次项系数同号，经过单根时变号。
第3步：$[3, 5)$。
→ 原理：继续运用：数轴标根法：把分子、分母的根按顺序标在数轴上，最右侧区间与最高次项系数同号，经过单根时变号。
说明：定义域要求 $x \neq 5$。分子为 $2(x-3)$，分式在 $3 < x < 5$ 时为负，在 $x = 3$ 时等于零，区间外为正。因此解集为 $[3, 5)$。
结论：选 C。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – Điều kiện $x \neq 5$; tử $2x - 6 = 0 \iff x = 3$.
→ Lý thuyết: Phân thức chỉ có nghĩa khi mẫu khác 0; giá trị làm mẫu bằng 0 luôn bị loại khỏi tập xác định và tập nghiệm.
Bước 2 – Xét dấu: $(-\infty, 3)$: $+$; $(3, 5)$: $-$; $(5, +\infty)$: $+$.
→ Lý thuyết: Phương pháp xét dấu (trục số): đặt các nghiệm của tử và mẫu lên trục số theo thứ tự tăng; khoảng ngoài cùng bên phải cùng dấu với hệ số cao nhất, và dấu đổi khi đi qua mỗi nghiệm đơn.
Bước 3 – ≤ 0: $3 \leq x < 5$.
→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Phương pháp xét dấu (trục số): đặt các nghiệm của tử và mẫu lên trục số theo thứ tự tăng; khoảng ngoài cùng bên phải cùng dấu với hệ số cao nhất, và dấu đổi khi đi qua mỗi nghiệm đơn.
Nhận xét: Điều kiện $x \neq 5$. Tử số là $2(x-3)$, nên phân thức âm khi $3 < x < 5$ và bằng 0 tại $x = 3$; ngoài khoảng này phân thức dương. Vậy tập nghiệm là $[3, 5)$.
Kết luận: chọn C.

Mở đề bài / 查看题目