2026-10-22 CSCA30_De_12_Cau_004

Mã bài CSCA30_De_12_Cau_004
Đề 12 · Câu 004 · Ngày 2026-10-22
Chương 02 - Bất đẳng thức · Dễ

Kết quả / 答案 D

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$(x-3)(x-5)>0$。
→ 原理：因式分解：找出两根，写成 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$。
第2步：$x<3$ 或 $x>5$。
→ 原理：二次式 ax^2+bx+c（$a>0$）有两根 $x_1<x_2$
时：两根之间为负，两根之外为正；带等号的不等式要包含根。
说明：因式分解得 $x^2-8x+15=(x-3)(x-5)$，两根为 $3,5$
。二次项系数为正，故在两根外侧为正，因不等号为 $>$，不包含两根。解集为 $(-\infty,3)\cup(5,+\infty)$。
结论：选 D。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $x^2-8x+15=(x-3)(x-5)$.
→ Lý thuyết: Phân tích tam thức thành nhân tử: tìm hai nghiệm (hai số có tổng $-\frac{b}{a}$ và tích $\frac{c}{a}$) rồi viết $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
Bước 2 – Dương ngoài khoảng nghiệm: $x<3$ hoặc $x>5$.
→ Lý thuyết: Dấu tam thức bậc hai ax^2+bx+c với $a>0$ có hai nghiệm $x_1<x_2$: âm khi $x_1<x<x_2$ (giữa hai nghiệm), dương khi $x<x_1$ hoặc $x>x_2$ (ngoài hai nghiệm); bất phương trình có dấu "$\geq$" hay "$\leq$" thì lấy cả nghiệm.
Nhận xét: Ta có $x^2-8x+15=(x-3)(x-5)$, có hai nghiệm 3 và 5. Hệ số bậc hai dương nên biểu thức dương ngoài hai nghiệm; loại hai nghiệm vì dấu $>$. Tập nghiệm là $(-\infty,3)\cup(5,+\infty)$.
Kết luận: chọn D.

Mở đề bài / 查看题目