2026-10-22 CSCA30_De_19_Cau_005

Mã bài CSCA30_De_19_Cau_005
Đề 19 · Câu 005 · Ngày 2026-10-22
Chương 02 - Bất đẳng thức · Dễ

Kết quả / 答案 C

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$(x+1)(x-2)>0$。
→ 原理：因式分解：找出两根，写成 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$。
第2步：$x<-1$ 或 $x>2$。
→ 原理：继续运用：因式分解：找出两根，写成 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$。
说明：因式分解为 $x^2-1x-2=(x+1)(x-2)$，两根为 $-1<2$
。二次项系数为正，故两根外侧取正值；严格不等式不取两个根。因此解集为 $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$。
结论：选 C。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $x^2-x-2=(x+1)(x-2)$.
→ Lý thuyết: Phân tích tam thức thành nhân tử: tìm hai nghiệm (hai số có tổng $-\frac{b}{a}$ và tích $\frac{c}{a}$) rồi viết $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
Bước 2 – $x<-1$ hoặc $x>2$.
→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Phân tích tam thức thành nhân tử: tìm hai nghiệm (hai số có tổng $-\frac{b}{a}$ và tích $\frac{c}{a}$) rồi viết $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
Nhận xét: Phân tích $x^2-1x-2=(x+1)(x-2)$, có hai nghiệm $-1<2$. Hệ số bậc hai dương nên biểu thức dương ở ngoài khoảng giữa hai nghiệm; bất đẳng thức ngặt nên loại hai nghiệm. Vậy tập nghiệm là $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$.
Kết luận: chọn C.

Mở đề bài / 查看题目