2026-10-22 CSCA30_De_28_Cau_005

Mã bài CSCA30_De_28_Cau_005
Đề 28 · Câu 005 · Ngày 2026-10-22
Chương 02 - Bất đẳng thức · Dễ

Kết quả / 答案 B

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$(x+1)(x-5)>0$。
→ 原理：因式分解：找出两根，写成 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$。
第2步：$x<-1$ 或 $x>5$。
→ 原理：继续运用：因式分解：找出两根，写成 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$。
说明：分解为 $x^2-4x-5=(x+1)(x-5)$。二次项系数为正，故在两根 $-1,5$ 外侧取正值。因此 $x<-1$ 或 $x>5$，严格不等式不包含两根。
结论：选 B。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $x^2-4x-5=(x+1)(x-5)$.
→ Lý thuyết: Phân tích tam thức thành nhân tử: tìm hai nghiệm (hai số có tổng $-\frac{b}{a}$ và tích $\frac{c}{a}$) rồi viết $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
Bước 2 – $x<-1$ hoặc $x>5$.
→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Phân tích tam thức thành nhân tử: tìm hai nghiệm (hai số có tổng $-\frac{b}{a}$ và tích $\frac{c}{a}$) rồi viết $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
Nhận xét: Ta có $x^2-4x-5=(x+1)(x-5)$. Hệ số của x^2 dương nên biểu thức dương ở ngoài hai nghiệm $-1,5$. Vậy $x<-1$ hoặc $x>5$; không lấy hai nghiệm vì bất đẳng thức nghiêm.
Kết luận: chọn B.

Mở đề bài / 查看题目