2026-10-22 CSCA30_De_30_Cau_003

Mã bài CSCA30_De_30_Cau_003
Đề 30 · Câu 003 · Ngày 2026-10-22
Chương 02 - Bất đẳng thức · Dễ

Kết quả / 答案 D

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$(x+3)(x-4)>0$。
→ 原理：因式分解：找出两根，写成 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$。
第2步：$x<-3$ 或 $x>4$。
→ 原理：继续运用：因式分解：找出两根，写成 $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$。
说明：分解为 $x^2-1x-12=(x+3)(x-4)$。二次项系数为正，故在两根 $-3,4$ 外侧取正值。因此 $x<-3$ 或 $x>4$，严格不等式不包含两根。
结论：选 D。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $x^2-x-12=(x+3)(x-4)$.
→ Lý thuyết: Phân tích tam thức thành nhân tử: tìm hai nghiệm (hai số có tổng $-\frac{b}{a}$ và tích $\frac{c}{a}$) rồi viết $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
Bước 2 – $x<-3$ hoặc $x>4$.
→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Phân tích tam thức thành nhân tử: tìm hai nghiệm (hai số có tổng $-\frac{b}{a}$ và tích $\frac{c}{a}$) rồi viết $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
Nhận xét: Ta có $x^2-1x-12=(x+3)(x-4)$. Hệ số của x^2 dương nên biểu thức dương ở ngoài hai nghiệm $-3,4$. Vậy $x<-3$ hoặc $x>4$; không lấy hai nghiệm vì bất đẳng thức nghiêm.
Kết luận: chọn D.

Mở đề bài / 查看题目