# 2026-10-22 CSCA30_De_15_Cau_010

Mã bài CSCA30_De_15_Cau_010
Đề 15 · Câu 010 · Ngày 2026-10-22
Chương 03 - Hàm số · Dễ

Kết quả / 答案 B

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：定义域对称。
→ 原理：若定义域关于原点对称且 $f(-x)=f(x)$，则为偶函数（图像关于 $y$ 轴对称）；若 $f(-x)=-f(x)$，则为奇函数（关于原点对称），奇函数在 0 处有定义时 $f(0)=0$。
第2步：$f(-x)=f(x)$，偶函数。
→ 原理：同上，若定义域关于原点对称且 $f(-x)=f(x)$，则为偶函数（图像关于 $y$ 轴对称）；若 $f(-x)=-f(x)$，则为奇函数（关于原点对称），奇函数在 0 处有定义时 $f(0)=0$。
第3步：$f(0)\neq 0$，非奇函数。
→ 原理：同上，若定义域关于原点对称且 $f(-x)=f(x)$，则为偶函数（图像关于 $y$ 轴对称）；若 $f(-x)=-f(x)$，则为奇函数（关于原点对称），奇函数在 0 处有定义时 $f(0)=0$。
说明：定义域 $\mathbb{R}$ 关于原点对称，且 $f(-x)=(-x)^4+2=f(x)$，所以是偶函数。由于 $f(0)=2\neq 0$，它不是奇函数。
结论：选 B。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – Tập xác định $\mathbb{R}$ đối xứng.
→ Lý thuyết: Hàm $f$ là hàm chẵn nếu tập xác định đối xứng qua 0 và $f(-x)=f(x)$ (đồ thị đối xứng qua $Oy$); là hàm lẻ nếu $f(-x)=-f(x)$ (đối xứng qua gốc $O$). Hàm lẻ xác định tại 0 thì $f(0)=0$.
Bước 2 – $f(-x)=x^4+2=f(x)$: chẵn.
→ Lý thuyết: nhắc lại – Hàm $f$ là hàm chẵn nếu tập xác định đối xứng qua 0 và $f(-x)=f(x)$ (đồ thị đối xứng qua $Oy$); là hàm lẻ nếu $f(-x)=-f(x)$ (đối xứng qua gốc $O$).
Bước 3 – $f(0)=2\neq 0$: không lẻ.
→ Lý thuyết: nhắc lại – Hàm $f$ là hàm chẵn nếu tập xác định đối xứng qua 0 và $f(-x)=f(x)$ (đồ thị đối xứng qua $Oy$); là hàm lẻ nếu $f(-x)=-f(x)$ (đối xứng qua gốc $O$).
Nhận xét: Tập xác định $\mathbb{R}$ đối xứng qua 0 và $f(-x)=(-x)^4+2=f(x)$, nên hàm chẵn. Hàm không lẻ vì $f(0)=2\neq 0$.
Kết luận: chọn B.

Mở đề bài / 查看题目