# 2026-10-22 CSCA30_De_29_Cau_013

Mã bài CSCA30_De_29_Cau_013
Đề 29 · Câu 013 · Ngày 2026-10-22
Chương 03 - Hàm số · Dễ

Kết quả / 答案 A

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$2^t$ 递增。
→ 原理：指数函数 $a^x$ 与对数函数 $\log_a x$：$a>1$ 时递增，$0<a<1$ 时递减；递增保持不等号方向，递减改变方向；指数函数值恒为正。
第2步：其余有反例。
→ 原理：要否定"恒成立"的命题，只需举出一个反例。
说明：由于底数 $2>1$，函数 $y=2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。因此 $a>b \Rightarrow 2^a>2^b$。平方、倒数及正弦在此处并不对所有实数保持所列大小关系。
结论：选 A。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $2^t$ đồng biến: $2^a > 2^b$.
→ Lý thuyết: Hàm mũ $y=a^x$ và hàm logarit $y=\log_a x$ đồng biến khi $a>1$, nghịch biến khi $0<a<1$. Hàm đồng biến giữ nguyên chiều bất đẳng thức, hàm nghịch biến đảo chiều. Hàm mũ luôn có giá trị dương.
Bước 2 – B, C, D có phản ví dụ.
→ Lý thuyết: Để bác bỏ một khẳng định "luôn đúng", chỉ cần chỉ ra một trường hợp cụ thể làm nó sai (phản ví dụ).
Nhận xét: Vì cơ số $2>1$ nên hàm $y=2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Do đó $a>b \Rightarrow 2^a>2^b$. Bình phương, nghịch đảo và hàm sin không bảo toàn thứ tự trên toàn bộ miền đang xét.
Kết luận: chọn A.

Mở đề bài / 查看题目