2026-10-22 CSCA30_De_20_Cau_027

Mã bài CSCA30_De_20_Cau_027

Đề 20 · Câu 027 · Ngày 2026-10-22

Chương 07 - Dãy số · Dễ

Kết quả / 答案 C

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$d=-4$。

→ 原理：等差数列通项 $a_n=a_1+(n-1)d$，公差 $d=a_{n+1}-a_n$；已知两项可求 $d=\frac{a_m-a_k}{m-k}$。

第2步：$a_5=-22$。

→ 原理：继续运用：等差数列通项 $a_n=a_1+(n-1)d$，公差 $d=a_{n+1}-a_n$；已知两项可求 $d=\frac{a_m-a_k}{m-k}$。

说明：公差 $d=a_2-a_1=-10-(-6)=-4$。故 $a_5=a_1+4d=-6+4\cdot(-4)=-22$。

结论：选 C。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $d=-10-(-6)=-4$.

→ Lý thuyết: Cấp số cộng: $a_n=a_1+(n-1)d$, trong đó công sai $d=a_{n+1}-a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được d: $d=\frac{a_m-a_k}{m-k}$.

Bước 2 – $a_5=-6+4\cdot(-4)=-22$.

→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Cấp số cộng: $a_n=a_1+(n-1)d$, trong đó công sai $d=a_{n+1}-a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được d: $d=\frac{a_m-a_k}{m-k}$.

Nhận xét: Công sai $d=a_2-a_1=-10-(-6)=-4$. Do đó $a_5=a_1+4d=-6+4\cdot(-4)=-22$.

Kết luận: chọn C.

Mở đề bài / 查看题目