# 2026-10-22 CSCA30_De_23_Cau_026

Mã bài CSCA30_De_23_Cau_026

Đề 23 · Câu 026 · Ngày 2026-10-22

Chương 07 - Dãy số · Dễ

Kết quả / 答案 B

## 解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$a_{50} = 6 + 147$。

→ 原理：等差数列通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$，公差 $d = a_{n+1} - a_n$；已知两项可求 $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$。

第2步：$153$。

→ 原理：继续运用：等差数列通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$，公差 $d = a_{n+1} - a_n$；已知两项可求 $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$。

说明：利用等差数列通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$。代入得 $a_{50} = 6 + (50-1) \cdot (3) = 153$。

结论：选 B。

## Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $a_{50} = 6 + 49 \cdot 3$.

→ Lý thuyết: Cấp số cộng: $a_n = a_1 + (n-1)d$, trong đó công sai $d = a_{n+1} - a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được $d$: $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$.

Bước 2 – $= 153$.

→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Cấp số cộng: $a_n = a_1 + (n-1)d$, trong đó công sai $d = a_{n+1} - a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được $d$: $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$.

Nhận xét: Dùng công thức số hạng tổng quát $a_n = a_1 + (n-1)d$. Thay số được $a_{50} = 6 + (50-1) \cdot (3) = 153$.

Kết luận: chọn B.

Mở đề bài / 查看题目