2026-10-22 CSCA30_De_25_Cau_025

Mã bài CSCA30_De_25_Cau_025
Đề 25 · Câu 025 · Ngày 2026-10-22
Chương 07 - Dãy số · Dễ

Kết quả / 答案 A

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：第 1、3 个是等差数列。
→ 原理：等差数列通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$，公差 $d = a_{n+1} - a_n$；已知两项可求 $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$。
第2步：共 2 个。
→ 原理：把已求得的值代入上一步的公式，按先乘方、再乘除、后加减的顺序仔细计算，并约分到最简。
说明：第一个数列的公差为 -6，第三个是公差为0的常数列。第二个数列的相邻差为 $2, 3, 4$，第四个为 $2, 4, 8$，均不恒定。因此共有2个等差数列。
结论：选 A。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $3, -3, -9, -15$ (công sai -6) và $3, 3, 3, 3$ là cấp số cộng.
→ Lý thuyết: Cấp số cộng: $a_n = a_1 + (n-1)d$, trong đó công sai $d = a_{n+1} - a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được d: $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$.
Bước 2 – Hai dãy còn lại không phải.
→ Lý thuyết: Thay các giá trị đã có vào công thức của bước trước và tính toán cẩn thận theo thứ tự: lũy thừa, rồi nhân – chia, cuối cùng cộng – trừ; rút gọn phân số về tối giản.
Nhận xét: Dãy thứ nhất có công sai -6; dãy thứ ba là dãy hằng, công sai 0. Các hiệu liên tiếp của dãy thứ hai là $2, 3, 4$, của dãy thứ tư là $2, 4, 8$, nên không cố định. Vậy có 2 cấp số cộng.
Kết luận: có 2 dãy, chọn A.

Mở đề bài / 查看题目