2026-10-22 CSCA30_De_30_Cau_027

Mã bài CSCA30_De_30_Cau_027

Đề 30 · Câu 027 · Ngày 2026-10-22

Chương 07 - Dãy số · Dễ

Kết quả / 答案 D

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$d = 2$。

→ 原理：等差数列通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$，公差 $d = a_{n+1} - a_n$；已知两项可求 $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$。

第2步：14。

→ 原理：继续运用：等差数列通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$，公差 $d = a_{n+1} - a_n$；已知两项可求 $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$。

说明：公差 $d = a_2 - a_1 = (8) - (6) = 2$。由等差数列通项公式，$a_5 = a_1 + (5-1)d = 6 + 4 \cdot (2) = 14$。

结论：选 D。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $d = 8 - 6 = 2$.

→ Lý thuyết: Cấp số cộng: $a_n = a_1 + (n-1)d$, trong đó công sai $d = a_{n+1} - a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được d: $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$.

Bước 2 – $a_5 = 6 + 8 = 14$.

→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Cấp số cộng: $a_n = a_1 + (n-1)d$, trong đó công sai $d = a_{n+1} - a_n$ không đổi; biết hai số hạng bất kỳ là tìm được d: $d = \frac{a_m - a_k}{m-k}$.

Nhận xét: Công sai $d = a_2 - a_1 = (8) - (6) = 2$. Áp dụng công thức số hạng tổng quát: $a_5 = a_1 + (5-1)d = 6 + 4 \cdot (2) = 14$.

Kết luận: chọn D.

Mở đề bài / 查看题目