2026-10-22 CSCA30_De_25_Cau_028

Mã bài CSCA30_De_25_Cau_028

Đề 25 · Câu 028 · Ngày 2026-10-22

Chương 07 - Dãy số · Trung bình

Kết quả / 答案 B

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$a_1+a_{13}=2a_7$。

→ 原理：等差中项：$a_{k-1}+a_{k+1}=2a_k$；一般地，$m+n=p+q$ 时 $a_m+a_n=a_p+a_q$。

第2步：91。

→ 原理：等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n[2a_1+(n-1)d]}{2}$；$n$ 为奇数时 $S_n=n\times$中间项。

说明：等差数列中，关于第7项对称的两项之和等于 $2a_7$。故 $S_{13}=\frac{13(a_1+a_{13})}{2}=13a_7=13\cdot 7=91$。

结论：选 B。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $a_1+a_{13}=2a_7$.

→ Lý thuyết: Tính chất cấp số cộng: số hạng giữa bằng trung bình cộng hai số hạng cách đều nó ($a_{k-1}+a_{k+1}=2a_k$); tổng quát, $a_m+a_n=a_p+a_q$ khi $m+n=p+q$.

Bước 2 – $S_{13}=13\cdot 7=91$.

→ Lý thuyết: Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng: $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n[2a_1+(n-1)d]}{2}$; khi n lẻ, $S_n=n\cdot$ (số hạng chính giữa).

Nhận xét: Trong cấp số cộng, hai số hạng cách đều số hạng thứ 7 có tổng bằng $2a_7$. Vì vậy $S_{13}=\frac{13(a_1+a_{13})}{2}=13a_7=13\cdot 7=91$.

Kết luận: chọn B.

Mở đề bài / 查看题目