2026-10-22 CSCA30_De_13_Cau_035

Mã bài CSCA30_De_13_Cau_035

Đề 13 · Câu 035 · Ngày 2026-10-22

Chương 09 - Đường thẳng trong mặt phẳng · Dễ

Kết quả / 答案 D

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$k=\frac{-5}{1}$。

→ 原理：斜率 $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$；倾斜角为 α 时 $k=\tan\alpha$（$0^\circ\le\alpha<180^\circ$）。

第2步：-5。

→ 原理：继续运用：斜率 $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$；倾斜角为 α 时 $k=\tan\alpha$（$0^\circ\le\alpha<180^\circ$）。

说明：两点横坐标不同，故斜率存在。由斜率公式 $k=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{-10-(-5)}{0-(-1)}=-5$。

结论：选 D。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $k=\frac{-10-(-5)}{0-(-1)}$.

→ Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng qua hai điểm: $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ($x_1\neq x_2$); nếu góc nghiêng là α ($0^\circ\le\alpha<180^\circ$) thì $k=\tan\alpha$. Chú ý cách viết $\frac{-2}{-3}=\frac{2}{3}$.

Bước 2 – $=-5$.

→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Hệ số góc của đường thẳng qua hai điểm: $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ($x_1\neq x_2$); nếu góc nghiêng là α ($0^\circ\le\alpha<180^\circ$) thì $k=\tan\alpha$.

Nhận xét: Hai hoành độ khác nhau nên hệ số góc xác định. Áp dụng $k=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{-10-(-5)}{0-(-1)}=-5$.

Kết luận: chọn D.

Mở đề bài / 查看题目