2026-10-22 CSCA30_De_08_Cau_027

Mã bài CSCA30_De_08_Cau_027

Đề 08 · Câu 027 · Ngày 2026-10-22

Chương 10 - Đường conic · Dễ

Kết quả / 答案 A

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$a^2=b^2=1$。

→ 原理：双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$：正项决定实轴，$c^2=a^2+b^2$，焦点 $(\pm c,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}>1$，渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$。

第2步：$c=\sqrt{2}$。

→ 原理：同上，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$：正项决定实轴，$c^2=a^2+b^2$，焦点 $(\pm c,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}>1$，渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$。

第3步：焦点 $(\pm\sqrt{2},0)$。

→ 原理：继续运用：双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$：正项决定实轴，$c^2=a^2+b^2$，焦点 $(\pm c,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}>1$，渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$。

说明：$a^2=b^2=1$，故 $c^2=2$。实轴为 x 轴，因此焦点为 $(\pm\sqrt{2},0)$。

结论：选 A。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $a^2=b^2=1$, trục thực Ox.

→ Lý thuyết: Hypebol $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$: số hạng mang dấu dương cho biết trục thực; $c^2=a^2+b^2$, tiêu điểm $(\pm c,0)$, tâm sai $e=\frac{c}{a}>1$, tiệm cận $y=\pm\frac{b}{a}x$.

Bước 2 – $c^2=a^2+b^2=2$, $c=\sqrt{2}$.

→ Lý thuyết: nhắc lại – Hypebol $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$: số hạng mang dấu dương cho biết trục thực; $c^2=a^2+b^2$, tiêu điểm $(\pm c,0)$, tâm sai $e=\frac{c}{a}>1$, tiệm cận $y=\pm\frac{b}{a}x$.

Bước 3 – Tiêu điểm $(\pm\sqrt{2},0)$.

→ Lý thuyết: tiếp tục áp dụng – Hypebol $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$: số hạng mang dấu dương cho biết trục thực; $c^2=a^2+b^2$, tiêu điểm $(\pm c,0)$, tâm sai $e=\frac{c}{a}>1$, tiệm cận $y=\pm\frac{b}{a}x$.

Nhận xét: Ta có $a^2=b^2=1$, nên $c^2=a^2+b^2=2$. Trục thực là Ox, vậy tiêu điểm $(\pm\sqrt{2},0)$.

Kết luận: chọn A.

Mở đề bài / 查看题目