2026-10-22 CSCA30_De_14_Cau_040

Mã bài CSCA30_De_14_Cau_040

Đề 14 · Câu 040 · Ngày 2026-10-22

Chương 10 - Đường conic · Dễ

Kết quả / 答案 A

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：圆心 $(-4,-4)$。

→ 原理：圆的标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$，圆心 (a,b)，半径 R；右边是 R^2，括号内符号与圆心坐标相反。

第2步：$(x+4)^2+(y+4)^2=16$。

→ 原理：同上，圆的标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$，圆心 (a,b)，半径 R；右边是 R^2，括号内符号与圆心坐标相反。

说明：圆心为 (a,b)、半径为 r 的圆方程是 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$。代入得 $(x-(-4))^2+(y-(-4))^2=16$，即 $(x+4)^2+(y+4)^2=16$。

结论：选 A。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – Tâm $(-4,-4)$, $r^2=16$.

→ Lý thuyết: Đường tròn tâm $I(a,b)$, bán kính R: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. Chú ý vế phải là R^2 (không phải R) và dấu trong ngoặc ngược với dấu tọa độ tâm.

Bước 2 – $(x+4)^2+(y+4)^2=16$.

→ Lý thuyết: nhắc lại – Đường tròn tâm $I(a,b)$, bán kính R: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$.

Nhận xét: Đường tròn tâm (a,b), bán kính r có phương trình $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$. Thay số được $(x-(-4))^2+(y-(-4))^2=16$, tương đương với $(x+4)^2+(y+4)^2=16$.

Kết luận: chọn A.

Mở đề bài / 查看题目