2026-10-22 CSCA30_De_22_Cau_043

Mã bài CSCA30_De_22_Cau_043
Đề 22 · Câu 043 · Ngày 2026-10-22
Chương 10 - Đường conic · Dễ

Kết quả / 答案 C

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$a = 3$。
→ 原理：与标准方程 $y^2 = 4ax$ 比较：焦点 $(a, 0)$，准线 $x = -a$，对称轴为 x 轴，只有一个焦点。
第2步：焦点 $(3, 0)$。
→ 原理：把已求得的值代入上一步的公式，按先乘方、再乘除、后加减的顺序仔细计算，并约分到最简。
说明：与 $y^2 = 4ax$ 对照得 $a = 3$，唯一焦点为 $F(3, 0)$。对称轴为 $y = 0$
，开口向右且点的横坐标不能为负，因此其余说法错误。
结论：选 C。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $a = 3$.
→ Lý thuyết: So sánh với dạng chuẩn $y^2 = 4ax$ (ở đây ký hiệu a đóng vai trò p): parabol có tiêu điểm $(a, 0)$, đường chuẩn $x = -a$, trục đối xứng là Ox ($y = 0$) và chỉ có một tiêu điểm.
Bước 2 – Tiêu điểm duy nhất $(3, 0)$.
→ Lý thuyết: Thay các giá trị đã có vào công thức của bước trước và tính toán cẩn thận theo thứ tự: lũy thừa, rồi nhân – chia, cuối cùng cộng – trừ; rút gọn phân số về tối giản.
Nhận xét: So với dạng $y^2 = 4ax$, ta có $a = 3$; tiêu điểm duy nhất là $F(3, 0)$. Trục đối xứng là $y = 0$; parabol mở sang phải và không có điểm có hoành độ âm, nên các khẳng định khác sai.
Kết luận: chọn C.

Mở đề bài / 查看题目