2026-10-22 CSCA30_De_24_Cau_041

Mã bài CSCA30_De_24_Cau_041

Đề 24 · Câu 041 · Ngày 2026-10-22

Chương 10 - Đường conic · Dễ

Kết quả / 答案 B

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：配方得 $(x-1)^2+(y+1)^2=36$。

→ 原理：圆的标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$，圆心 (a,b)，半径 R；右边是 R^2，括号内符号与圆心坐标相反。

第2步：$r=6$。

→ 原理：同上，圆的标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$，圆心 (a,b)，半径 R；右边是 R^2，括号内符号与圆心坐标相反。

说明：配方得 $(x-1)^2+(y+1)^2=36$。所以圆心为 $I(1,-1)$，半径为 $r=\sqrt{36}=6$。

结论：选 B。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $(x-1)^2+(y+1)^2=34+1+1=36$.

→ Lý thuyết: Đường tròn tâm $I(a,b)$, bán kính R: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. Chú ý vế phải là R^2 (không phải R) và dấu trong ngoặc ngược với dấu tọa độ tâm.

Bước 2 – Tâm $(1,-1)$, $r=6$.

→ Lý thuyết: nhắc lại – Đường tròn tâm $I(a,b)$, bán kính R: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$.

Nhận xét: Hoàn thành bình phương đưa phương trình về $(x-1)^2+(y+1)^2=36$. Vậy tâm là $I(1,-1)$ và bán kính $r=\sqrt{36}=6$.

Kết luận: chọn B.

Mở đề bài / 查看题目