# 2026-10-22 CSCA30_De_20_Cau_039

Mã bài CSCA30_De_20_Cau_039
Đề 20 · Câu 039 · Ngày 2026-10-22
Chương 11 - Vectơ mặt phẳng · Dễ

Kết quả / 答案 B

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$\Delta x = \Delta y = -5$。
→ 原理：两点间距离（向量的模）：$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$（勾股定理），空间中再加 $(z_2 - z_1)^2$。
第2步：$\sqrt{50}$。
→ 原理：同上，两点间距离（向量的模）：$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$（勾股定理），空间中再加 $(z_2 - z_1)^2$。
说明：由两点距离公式 $PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2}$。代入得 $PQ = \sqrt{(-6 - (-1))^2 + (0 - (5))^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$。
结论：选 B。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $\Delta x = -5$, $\Delta y = -5$.
→ Lý thuyết: Khoảng cách hai điểm (độ dài vectơ): $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, chính là định lý Pythagore; trong không gian thêm $(z_2 - z_1)^2$. Phương trình chứa bình phương thường cho hai nghiệm, phải lấy đủ.
Bước 2 – $PQ = \sqrt{50}$.
→ Lý thuyết: nhắc lại – Khoảng cách hai điểm (độ dài vectơ): $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, chính là định lý Pythagore; trong không gian thêm $(z_2 - z_1)^2$.
Nhận xét: Dùng công thức $PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2}$. Thay số được $PQ = \sqrt{(-6 - (-1))^2 + (0 - (5))^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.
Kết luận: chọn B.

Mở đề bài / 查看题目