2026-10-22 CSCA30_De_12_Cau_046

Mã bài CSCA30_De_12_Cau_046

Đề 12 · Câu 046 · Ngày 2026-10-22

Chương 18 - Biến cố ngẫu nhiên và xác suất · Dễ

Kết quả / 答案 A

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：偶数 3 个。

→ 原理：古典概型：$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$，即有利结果数除以基本事件总数；概率总在 $[0,1]$ 内。

第2步：$P=\frac{1}{2}$。

→ 原理：同上，古典概型：$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$，即有利结果数除以基本事件总数；概率总在 $[0,1]$ 内。

说明：共有 $1,2,3,4,5,6$ 六个等可能结果，其中偶数为 $2,4,6$ 三个，所以概率为 $3/6=1/2$。

结论：选 A。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – 6 kết quả đồng khả năng; số chẵn: $2,4,6$.

→ Lý thuyết: Xác suất cổ điển: khi mọi kết quả đồng khả năng, $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$ = số kết quả thuận lợi : tổng số kết quả. Xác suất luôn nằm trong $[0,1]$.

Bước 2 – $P=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

→ Lý thuyết: nhắc lại – Xác suất cổ điển: khi mọi kết quả đồng khả năng, $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$ = số kết quả thuận lợi : tổng số kết quả.

Nhận xét: Có 6 kết quả đồng khả năng: $1,2,3,4,5,6$. Các kết quả chẵn là $2,4,6$, nên xác suất là $3/6=1/2$.

Kết luận: chọn A.

Mở đề bài / 查看题目