2026-10-22 CSCA30_De_17_Cau_046

Mã bài CSCA30_De_17_Cau_046

Đề 17 · Câu 046 · Ngày 2026-10-22

Chương 18 - Biến cố ngẫu nhiên và xác suất · Dễ

Kết quả / 答案 C

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：共 6 个，红 2 个。

→ 原理：古典概型：$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$，即有利结果数除以基本事件总数；概率总在 $[0,1]$ 内。

第2步：$P=\frac{1}{3}$。

→ 原理：同上，古典概型：$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$，即有利结果数除以基本事件总数；概率总在 $[0,1]$ 内。

说明：共有 $2+4=6$ 个球，其中红球有 2 个。各球被取到的机会相同，所以 $P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。

结论：选 C。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – 6 quả đồng khả năng, 2 quả đỏ.

→ Lý thuyết: Xác suất cổ điển: khi mọi kết quả đồng khả năng, $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$ = số kết quả thuận lợi : tổng số kết quả. Xác suất luôn nằm trong $[0,1]$.

Bước 2 – $P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

→ Lý thuyết: nhắc lại – Xác suất cổ điển: khi mọi kết quả đồng khả năng, $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$ = số kết quả thuận lợi : tổng số kết quả.

Nhận xét: Có tổng cộng $2+4=6$ quả, trong đó 2 quả đỏ. Với mỗi quả có khả năng được chọn như nhau, xác suất là $P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

Kết luận: chọn C.

Mở đề bài / 查看题目