2026-11-07 CSCABS_C15_007

Mã bài CSCABS_C15_007

Bộ bổ sung · Câu 007 · Ngày 2026-11-07

Chương 15 - Đạo hàm · Dễ

Kết quả / 答案 C

解题步骤 · Lời giải tiếng Trung

第1步：$\sqrt{x}=x^{\frac{1}{2}}$，导数为 $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$。

→ 原理：基本求导公式：$(x^n)'=nx^{n-1}$，$(e^x)'=e^x$，$(\ln x)'=\frac{1}{x}$，$(\sin x)'=\cos x$，$(\cos x)'=-\sin x$。

结论：选 C。

Các bước giải · Lời giải tiếng Việt

Bước 1 – $\sqrt{x}=x^{1/2}$ nên $f'(x)=\frac{1}{2}x^{-1/2}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

→ Lý thuyết: Đạo hàm cơ bản: $(x^n)'=nx^{n-1}$, $(c)'=0$, $(e^x)'=e^x$, $(\ln x)'=\frac{1}{x}$, $(\sin x)'=\cos x$, $(\cos x)'=-\sin x$; đạo hàm của tổng bằng tổng các đạo hàm, hằng số nhân được đưa ra ngoài.

Kết luận: chọn C.

Mở đề bài / 查看题目